CROUPIER® OD

Principio attivo e formulato	**Fluroxypyr (324 g/l) e Metsulfuron-methyl puro 0,82% (9 g/l)**
Avvertenza	**ATTENZIONE**

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Certis Europe consiglia **Croupier® OD**, erbicida costituito dalla miscela di due principi attivi aventi diverso meccanismo d'azione e azione complementare: Fluroxypyr (324 g/l) e Metsulfuron-methyl (9 g/l).

Croupier® OD è in grado di **controllare le principali infestanti** dicotiledoni **dei cereali autunno-vernini** (frumento tenero, frumento duro, orzo, segale e triticale).

Metsulfuron agisce sulle infestanti dicotiledoni presenti al momento del trattamento **bloccando la crescita con progressiva devitalizzazione**: la sua azione è lenta (in funzione delle temperature e dello stadio di sviluppo delle infestanti), ma risolutiva. Viene assorbito dalle foglie e dalle radici e velocemente traslocato nelle piante per via acropeta e basipeta, accumulandosi nei meristemi dei culmi e delle radici. Manifesta azione fogliare e radicale, **non inibisce la germinazione dei semi**, ma, grazie alla persistenza d'azione, **ritarda o blocca la successiva crescita delle radici.** Grazie alla sua attività residuale, Metsulfuron incrementa il controllo delle infestanti dicotiledoni nelle situazioni caratterizzate da scarsa competizione colturale e nei trattamenti precoci.

Fluroxypyr svolge un'azione di tipo auxino-simile con **interferenze sulla biosintesi e sul metabolismo degli acidi nucleici.**

CROUPIER® OD

PROBLEMATICA

In particolare **Croupier® OD è attivo contro le seguenti dicotiledoni:** *Lamium purpureum, Anthemis arvensis, Bifora radians, Capsella bursa pastoris, Diplotaxis erucoides, Fallopia convolvulus, Fumaria officinalis, Galium aparine, Lactuga seriola, Matricaria camomilla, Papaver rhoeas, Raphanus raphanistrum, Rapistrum rugosum, Sinapis arvensis, Stellaria media, Thlaspi arvensis, Vicia sativa, Veronica persica, Veronica hederifolia, Viola arvensis, Ammi majus* e altre.

SOLUZIONE:

La formulazione dispersione oleosa (OD), in bottiglia da un litro, conferisce al prodotto migliori prestazioni nel controllo delle malerbe soprattutto in presenza di infestanti più sviluppate o eventualmente stressate da freddo o siccità, inoltre **non necessita dell'utilizzo di bagnanti o coadiuvanti e può essere utilizzata in miscela con altri erbicidi** dicotiledonicidi o graminicidi. I principi attivi vengono rapidamente assorbiti dalla vegetazione trattata: nelle specie sensibili si manifestano i sintomi di fitotossicità molto rapidamente (2 ore). Le piogge che cadono dopo un'ora dal trattamento non pregiudicano l'attività erbicida.

CERTIS
Growing Together

CROUPIER® OD

La sua flessibilità di impiego permette un'ottimale gestione della flora infestante, nei diversi areali di coltivazione, inoltre **consente di modulare i dosaggi di intervento in relazione allo stadio di sviluppo delle infestanti** presenti e all'epoca di intervento. Sono, comunque, da preferire interventi precoci in presenza di infestanti ai primi stadi di sviluppo e in attiva crescita al fine di evitare eccessivi fenomeni di competizione nei confronti della coltura.

CERTIS
Growing Together

CROUPIER® OD



CROUPIER® OD può essere applicato sui cereali dallo stadio di inizio accestimento (BBCH20) fino allo stadio di botticella.



Efficacia percentuale di Croupier® OD nei confronti di: Anthemis arvensis, Papaver rhoeas, Picris echioides, Galium aparine.

MISCELA CROUPIER E DUPLOSAN:

L' aggiunta di **dosaggi ridotti di Duplosan** consente di ottenere un completo **controllo di tutte le infestanti dicotiledoni** presenti al momento dell' intervento incluso cardo mariano e Papavero/Crucifere con problemi di resistenza nei confronti degli erbicidi con meccanismo di azione riconducibili agli ALS inibitori.

CERTIS
Growing Together

CROUPIER® OD

RACCOMANDAZIONI DI IMPIEGO

Croupier® OD è registrato su frumento tenero, frumento duro, orzo, segale e triticale alla **dose di 0,5-0,67 l/ha e può essere applicato dallo stadio di inizio accestimento fino allo stadio di botticella.**

- **Si consiglia di miscelare THIRAS in presenza di infestanti graminacce.**
- **Possibile miscela, a dosaggi ridotti, con Dusplosan Super per ampliare lo spettro per infestanti difficili.**
- **Intervenire in assenza di vento.**
- **Utilizzare volumi di acqua adeguati.**
- **Utilizzare ugelli antideriva.**
- **Intervenire con adeguate pressioni di esercizio.**

PUNTI DI FORZA DI CROUPIER

- ☑ **Elevata efficacia nei confronti delle principali infestati dicotiledoni dei cereali autunno-vernini;**
- ☑ **Migliore gestione delle infestanti nelle diverse situazioni grazie al dosaggio modulabile;**
- ☑ **Ottima miscibilità dicotiledonicidi e/o graminicidi;**
- ☑ **Perfettamente selettivo per le colture autorizzate;**
- ☑ **L'apporto "residuale" esercitato da metsulfuron incrementa il controllo delle infestanti dicotiledoni in situazioni caratterizzate da scarsa competizione colturale e in trattamenti precoci.**
- ☑ **Non necessità di bagnanti**

Vuoi saperne di più?
SCANSIONA IL QR CODE

Per ulteriori informazioni contattare:
Alessandro Almerighi
e-mail: almerighi@certiseurope.com
cell.: +39 335 6294075

® Marchio registrato Mitsui Agrisciences International SA/NV Ireland

USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SULLE FRASI E SUI SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATI IN ETICHETTA.