

# CYPERKILL® 50 EC

## INSETTICIDA PIRETROIDE AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE



### COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura 5,52% (=50 g/l)

### FORMULAZIONE

Emulsione acquosa

### REGISTRAZIONE

n. 15610 del 26/11/2012

### AVVERTENZA

ATTENZIONE



### CONFEZIONE

1 L (12 x 1 L)



® Marchio registrato

CYPERKILL® 50 EC è un insetticida piretroide che agisce per contatto ed ingestione nei confronti di adulti e stadi giovanili di numerosi insetti nocivi per le colture arboree ed erbacee. La formulazione innovativa con solvente di origine naturale conferisce al prodotto un'ottima attività abbattente e una elevata persistenza di azione. L'attività di CYPERKILL® 50 EC è indipendente dalle temperature.

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	INTERVALLO SICUREZZA	NOTE
<b>VITE DA VINO E DA TAVOLA</b>	Tignola, tignoletta, cicaline, sigarajo, <i>Sparganothis pilleriana</i>	0,6 l/ha	21 gg	Effettuare un solo trattamento per stagione.
<b>OLIVO (PIANTE NON IN PRODUZIONE)</b>	Mosca, tignola verde ( <i>Palpita unionalis</i> ) e tignola (generazione antofaga e carpofaga)	0,8-1 l/ha		Ripetere il trattamento, se necessario, dopo almeno 10 giorni.
<b>PATATA</b>	Dorifora, tignola			
<b>ORTAGGI A RADICE</b> (CAROTA, PREZZEMOLO A GROSSA RADICE, PASTINACA, CREN, SEDANO-RAPA, RAVANELLO, BIETOLA ROSSA, RUTABAGA, RAPA), <b>ORTAGGI A BULBO</b> (CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO), <b>ORTAGGI A FRUTTO</b> (POMODORO, MELANZANA, OKRA, MELONE, ZUCCA, COCOMERO E ALTRE CUCURBITACEE A BUCCIA NON COMMESTIBILE), <b>CAVOLI</b> (CAVOLFIORI, BROCCOLI, CAVOLI A TESTA), <b>LEGUMI</b> (PISELLO, PISELLO MANGIATUTTO, FAGIOLO, FAGIOLINO),	Nottuidi terricoli e fogliari ( <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Phthorimaea operculella</i> , <i>Pieris</i> sp., <i>Plutella</i> sp., <i>Mamestra</i> sp., <i>Autographa</i> sp., <i>Agrotis segetum</i> , etc.), coleotteri, afidi, tripidi, mosche bianche, cleono, lisso, Dorifora ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> ), <i>Diabrotica</i> sp., Sitona ( <i>Sitona lineatus</i> ), Tignola del porro ( <i>Acrolepiopsis assectella</i> ), Cicaline ( <i>Empoasca</i> spp)	1 l/ha	3 gg	Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni.
<b>ASPARGO</b>			-	T trattare dopo la raccolta dei turioni.

# CYPERKILL® 50 EC

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	INTERVALLO SICUREZZA	NOTE
CARCIOFO	Afidi, nottue	1 l/ha	3 gg	
COLZA, SENAPE, LINO	Altica, <i>Ceuthorinchus</i> , <i>Meligete</i>	0,5 l/ha	21 gg	Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni.
COTONE	Afidi, lepidotteri, tripidi	1 l/ha		
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO	Nottuidi terricoli e fogliari, coleotteri, afidi, cassida, cleono, lisso	1 l/ha	14 gg	
FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE)	Afidi, lema, lepidotteri	0,5 l/ha	28 gg	Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 14 giorni.
MAIS	Piralide ( <i>Ostrinia nubilalis</i> ), Sesamia ( <i>Sesamia cretica</i> ), Nottua gialla ( <i>Heliothis armigera</i> ) e Nottua delle messi ( <i>Agrotis segetum</i> ), Diabrotica ( <i>Diabrotica sp.</i> )	1,5 l/ha	-	Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. Non trattare dopo la fine della fioritura.
ERBA MEDICA	Nottuidi terricoli e fogliari ( <i>Heliothis armigera</i> , <i>Pratyedra gossypiella</i> , <i>Earias insulana</i> , <i>Agrotis segetum</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> ), Crisomelide nero ( <i>Colaspidea atrum</i> ), Punteruolo ( <i>Phytonomus variabilis</i> ), Afidi ( <i>Myzus spp.</i> , <i>Aphis spp.</i> ), Tripidi, Mosca Bianca ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	1 l/ha	7 gg	Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni.
FLOREALI, ORNAMENTALI, PIOPPO IN VIVAIO E GIOVANI IMPIANTI FORESTALI IN VIVAIO	Afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, mosche bianche, saperda e punteruolo del pioppo, limantria	0,5-1 l/ha	-	
TABACCO	Lepidotteri, afidi, mosca bianca, Cassida vittata	1 l/ha	14 gg	