

FAZOR STAR®

FITOREGOLATORE PER IL CONTROLLO DEI GERMOGLI DI CIPOLLA, AGLIO E PATATAE



COMPOSIZIONE

Idrazide maleica pura 60%

FORMULAZIONE

Granuli solubili

REGISTRAZIONE

n. 11258 del 04/04/2002

AVVERTENZA

-



CONFEZIONE

5 Kg (4 x 5 Kg)



® Marchio registrato

FAZOR STAR® viene assorbito dalle piante per via fogliare e traslocato in ogni suo organo per via linfatica. Nei germogli, inibisce principalmente i processi respiratori delle cellule, riduce le attività enzimatiche, rallenta la moltiplicazione cellulare. La sommatoria di queste complesse azioni impedisce lo sviluppo dei germogli. Nella cipolla, nell'aglio e nella patata FAZOR STAR® inibisce la germinazione durante la conservazione in magazzino evitando le perdite dovute alla disidratazione. Nella patata FAZOR STAR® migliora inoltre la qualità dei tuberi durante la conservazione e riduce la rinascita delle patate in campo.

COLTURA	DOSE	INTERVALLO SICUREZZA	NOTE
CIPOLLA	4 kg in 4-6 hl di acqua per ha	10 gg	Applicare FAZOR STAR® quando i bulbi sono pienamente maturi, nello stadio di inizio piegamento delle foglie. Questo stadio si individua quando il 10% delle foglie sono allettate, ma sono ancora verdi. Questo stadio si raggiunge da circa 2 settimane a 10 giorni prima della raccolta. La presenza di foglie verdi è essenziale per consentire l'assorbimento del FAZOR STAR® e la sua traslocazione. Il prodotto non ha effetto se la sua applicazione è troppo tardiva.
AGLIO			FAZOR STAR® si applica allo stadio che precede l'appassimento, quando tutte le foglie sono ancora verdi, appena prima il viraggio al colore giallo che si verifica da 2 settimane a 10 giorni prima della raccolta.
PATATA	5 kg in 4-6 hl di acqua per ha	21 gg	Il momento ottimale per l'applicare del FAZOR STAR® è quando il diametro medio dei tuberi secondari più piccoli destinati alla raccolta è di circa 20-25 mm. Gli interventi possono essere effettuati anche in epoche successive ma in questi casi si potrebbe verificare una riduzione di efficacia.