

# MIMIC®

## INSETTICIDA LARVICIDA SELETTIVO



### COMPOSIZIONE

Tebufenozide 22,5% (=240 g/l)

### FORMULAZIONE

Sospensione concentrata

### REGISTRAZIONE

n. 8836 del 30/04/1996

### AVVERTENZA

ATTENZIONE



### CONFEZIONE

1 L (12 x 1 L)



® Marchio registrato e prodotto originale Nippon Soda.

MIMIC® è un insetticida regolatore specifico per la lotta contro le larve di lepidotteri.

MIMIC® è un analogo mimetico dell'ecdisione. Agisce per ingestione inducendo il processo di muta nelle larve provocandone la morte. MIMIC® è selettivo nei confronti degli insetti utili e verso gli acari predatori; non induce acaro-insorgenza. MIMIC®, a differenza degli insetticidi tradizionali, ha un'efficacia e persistenza biologica indipendenti dalla temperatura. È inoltre indicato nelle strategie di difesa integrata.

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	INTERVALLO SICUREZZA	NOTE
VITE	<i>Lobesia botrana</i> , <i>Eupoecilia ambiguella</i> , <i>Sparganothis pilleriana</i>	60-70 ml/hl	30 gg	Contro le larve di 1° generazione, trattare in pre-fioritura. Per il controllo delle generazioni successive intervenire durante la fase di ovodeposizione entro la schiusura delle prime uova. Intervenire con attrezzature operanti a volumi normali rispettando la dose di 600-720 ml/ha. In caso di voli prolungati ripetere il trattamento a distanza di 14 giorni fino a un massimo di 2 applicazioni.
POMACEE (MELO E PERO)	<i>Carpocapsa</i> , <i>Eulia</i>  <i>Pandemis</i> spp., <i>Archips</i> spp., <i>Adoxophyes orana</i>  <i>Argyrotaenia pulchellana</i> , Tortricidi ricamatori	80 ml/hl	14 gg	Intervenire durante la fase di ovodeposizione entro la schiusura  Contro le larve svernanti in pre o post-fioritura.
AGRUMI	Minatrice serpentina ( <i>Phyllocnistis citrella</i> )	60 ml/hl		Effettuare il trattamento in corrispondenza dei nuovi flussi vegetativi, non appena compaiono le prime mine fogliari. In considerazione della biologia delle minatrici si consiglia di effettuare un secondo trattamento a distanza di 14 giorni dal primo fino ad un massimo di 2 applicazioni.
POMODORO PEPERONE (COLTURA PROTETTA)	Nottue ( <i>Spodoptera</i> spp., <i>Helicoverpa</i> spp., <i>Heliiothis</i> spp., <i>Ostrinia</i> spp.) <i>Tuta absoluta</i>	60-90 ml/hl	3 gg pomodoro 7 gg peperone	Effettuare il primo trattamento alla comparsa delle prime larve e ripetere il trattamento ad intervalli minimi di 7-14 giorni a seconda della intensità di infestazione fino ad un massimo di 3 applicazioni.
LATTUGHE E ALTRE INSALATE (PIENO CAMPO)	<i>Spodoptera exigua</i>	90 ml/hl	14 gg	Effettuare 1 solo trattamento all'anno, durante la fase di deposizione uova e comunque entro la comparsa delle prime larve.