

# ZEFIR® 25 WDG

## FUNGICIDA SISTEMICO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA ED ERADICANTE



### COMPOSIZIONE

Tebuconazolo puro 25%

### FORMULAZIONE

Microgranuli idrodispersibili

### REGISTRAZIONE

n. 15331 del 15/03/2012

### AVVERTENZA

ATTENZIONE



### CONFEZIONE

0,5 Kg (20 x 0,5 Kg)



© Marchio registrato

ZEFIR® 25 WDG è un fungicida a base di tebuconazolo, molecola ad ampio spettro d'azione, efficace contro i principali patogeni delle numerose colture autorizzate. Il prodotto è impiegabile su drupacee (come pesco, ciliegio, albicocco e susino contro monilia, oidio, botrite e ruggine), pomacee (per la difesa di melo e pero contro ticchiolatura ed oidio), su colture orticole e cerealicole.

Le sue proprietà sistemiche gli permettono di muoversi rapidamente nei tessuti vegetali, proteggendo anche la vegetazione in rapido accrescimento.

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	INTERVALLO SICUREZZA	NOTE
MELO E PERO	Ticchiolatura ( <i>Venturia</i> spp.)	40-50 g/hl	14 gg	Applicare alla dose indicata, senza superare i 0,75 kg/ha, in miscela con fungicidi citotropici (Dodina, ecc) o di copertura (Ditianon, Captano, Mancozeb, Tolfluandide, ecc.). Intervenire preventivamente ad intervalli di 6-8 giorni fino alla fase del frutto noce; successivamente allungare l'intervallo fra i trattamenti a 10-15 giorni. E' possibile utilizzare ZEFIR® 25 WDG anche con effetto curativo, trattando entro 72-96 ore dall'infezione.
	Oidio	40-50 g/hl		Non superare la dose di 0,75 kg/ha.
	Maculatura bruna del pero ( <i>Stemphylium vesicarium</i> )	50 g/hl		Non superare la dose di 0,75 kg/ha.
DRUPACEE (PESCO E NETTARINE, ALBICOCCO, CILIEGIO E SUSINO)	Monilia ( <i>Monilia</i> spp.) e Botrite	50-75 g/hl	7 gg	Sono consentite 3 applicazioni all'anno indipendentemente dalla patologia trattata. Non superare la dose di 1,125 kg/ha intervenendo: a) durante il periodo della fioritura; b) in pre-raccolta effettuando 1-2 applicazioni a distanza di 7 giorni.
	Oidio ( <i>Sphaerotheca</i> spp.)			Non superare la dose di 1,125 kg/ha.
	Ruggine del Susino ( <i>Tranzschelia</i> spp.)	50 g/hl		Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi, senza superare la dose di 1,125 kg/ha.
VITE	Oidio ( <i>Uncinula necator</i> )	40 g/hl	14 gg	Sono consentite 2 applicazioni all'anno indipendentemente dalla patologia trattata. Trattare ogni 10-14 giorni, senza superare la dose di 0,4 kg/ha, in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (Zolfi, Quinoxifen, ecc.). Sono consentite 3 applicazioni l'anno.

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	INTERVALLO SICUREZZA	NOTE
<b>MELONE, COCOMERO, CETRIOLO, ZUCCHINO, POMODORO, PEPERONE, CARCIOFO</b>	Oidio	50 g/hl	3-7 gg*	Trattare ogni 7-10 giorni alla dose indicata, senza superare la dose di 0,5 kg/ha. Sono consentite 4 applicazioni l'anno.
<b>FRUMENTO ED ORZO</b>	Complesso del "Malattie del piede"			Intervenire in fase di accestimento-levata.
	Oidio, Ruggini ( <i>Puccinia</i> spp.), Rincosporiosi ( <i>Rhynchosporium</i> spp.), Elmintosporiosi, Septoria ( <i>Septoria</i> spp.)	1 kg/ha	30 gg	Intervenire dalla fase di inizio levata alla spigatura.
	Fusariosi della spiga ( <i>Fusarium</i> spp.)			Intervenire in fase di piena fioritura.
				È consentita 1 sola applicazione all'anno indipendentemente dalla patologia trattata.
<b>TAPPETI ERBOSI</b>	<i>Microdochium nivale</i> , <i>Sclerotinia homeocarpa</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>	1,5-2 kg/ha	-	Intervenire alla comparsa dei primi sintomi e successivamente 10-20 giorni in funzione dell'evoluzione epidemica della malattia. È obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

\* 3 gg: pomodoro, peperone, cetriolo, zucchini; 7 gg: carciofo, cocomero, melone.