

LATITUDE® XL

**Fungicida sistemico per la concia dei cereali.
Concentrato fluido per concia.
Meccanismo d'azione: gruppo C7 (FRAC).**

COMPOSIZIONE

Silthiofam puro: g 11.81 (= 125 g/L)
Coformulanti: q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

INDICAZIONE DI PERICOLO: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene 1-(3-cloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane cloruro e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

Titolare della registrazione:

CERTIS EUROPE B.V.

Sede legale: Safariweg 55 – 3605 Maarssen (Paesi Bassi).

Sede secondaria: Via Varese 25/D – 21047 Saronno Tel. 02960 9983

Officine di produzione:

Schirm AG, Scholl Strasse 127, D-39128 Schonebeck, Germania

Autorizzazione Ministero della Salute n. 15747 del 19/05/2015

Taglie: litri 1, 5, 20, 200*

Partita n.: vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Indossare guanti protettivi e tuta da lavoro durante la manipolazione del prodotto concentrato o di oggetti/superfici contaminati. Indossare la tuta da lavoro durante il riempimento e lo stoccaggio dei sacchi contenenti le sementi trattate. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici i semi trattati devono essere interamente incorporati al terreno.

Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici recuperare i semi fuoriusciti accidentalmente.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni.

LATITUDE® XL fornisce una protezione efficace contro il mal del piede (*Gaeumannomyces graminis var. tritici*) se utilizzato secondo le istruzioni di impiego raccomandate. Il mal del piede è una malattia del terreno che colpisce i cereali invernali e primaverili (frumento, orzo, triticale e farro). LATITUDE® XL riduce la gravità della necrosi sulle radici e la comparsa di striminzimento del seme. Il risultato della protezione e qualità della coltura può variare a seconda dell'intensità dell'attacco. Sintomi di mal del piede possono essere visibili comunque in caso di attacchi gravi. LATITUDE® XL dimostra un'eccellente selettività. LATITUDE® XL non ha nessuna efficacia contro gli insetti del suolo quindi si raccomanda di proteggere il seme con prodotti specifici.

QUALITÀ DEL SEME DA TRATTARE (CONCIARE)

I semi da trattare devono avere una buona germinabilità e devono essere in buone condizioni. In assenza di garanzie sulla qualità del seme da trattare, la responsabilità del titolare della registrazione, rispetto all'applicatore, è limitata a fornire il prodotto LATITUDE® XL conforme ai requisiti tecnici e industriali.

DOSI D'IMPIEGO

Dosi suggerite per la concia del seme :

Frumento, Orzo, Triticale, Farro: 200 ml per 100 kg di seme.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Usare un'attrezzatura idonea alla concia del seme e correttamente regolata per garantire una distribuzione uniforme del prodotto sulla superficie del seme. Evitare l'agitazione continua per l'applicazione del prodotto. LATITUDE® XL si impiega diluito in acqua. Il volume minimo della miscela deve essere di 1 litro, di cui almeno 400 ml di acqua. LATITUDE® XL è una formulazione fisicamente stabile: se le indicazioni sullo stoccaggio sono rispettate, la formulazione resta omogenea.

LATITUDE® XL non necessita di essere agitato prima dell'utilizzo

STOCCAGGIO DEL SEME TRATTATO

Il seme conciato con LATITUDE® XL deve essere seminato nella stagione in corso poiché l'efficacia di LATITUDE® XL può essere compromessa da uno stoccaggio non corretto. I contenitori di LATITUDE® XL devono essere conservati al chiuso, lontano da fonti di luce diretta e dal sole. Proteggere i contenitori dal gelo ed evitare l'esposizione a temperature superiori a 30° C. Le cisterne devono essere conservate in posizione verticale e ben chiuse.

LE BUONE PRATICHE AGRICOLE

Si consiglia di eseguire una rotazione piuttosto che una continua successione di cereali.

Il contenitore vuoto del prodotto deve essere risciacquato almeno 3 volte e il suo contenuto utilizzato nella concia del seme.

Come per ogni malattia fungina lo sviluppo di eventuali resistenze non può essere né escluso né previsto. La comparsa di ceppi non suscettibili non permetterebbe al LATITUDE® XL un controllo soddisfacente della malattia. Per precauzione si raccomanda un controllo integrato della malattia e di seguire le buone pratiche agricole.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

* **Attenzione:** Il presente contenitore è di proprietà del titolare della registrazione, deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e, quando vuoto, restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale. **CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.**