

VALBON

**Fungicida citotropico e di contatto ad azione preventiva e curativa
contro le peronosspore in formulazione WG**

Composizione:

| | |
|-------------------------------|---------|
| Bentiavalicarb-isopropil puro | g. 1,75 |
| Mancozeb puro | g. 70 |
| Coformulanti quanto basta a | g. 100 |



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P103 - Leggere l'etichetta prima dell'uso. P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P263 - Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P281 - Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P308+P313 - In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P501 - Smaltire il contenuto / contenitore in un sito di smaltimento adatto secondo le leggi locali e normative nazionali.

CERTIS EUROPE B.V.

Via Varese 25/D, scala A - 21047 Saronno. Tel. 029609983

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12262 del 12/12/2007

Officina di produzione:

- Cerexagri B.V. - Tankhoofd 10 -3196 KE Vondelingenplaat/Rt - The Netherlands
- SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
- SCAM Spa - Strada Bellaria 164, 44100 Modena

Taglie: g. 100-200-250-500; Kg. 1-2-5-10-20 Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.

Gli addetti al rientro dovranno essere muniti di tuta standard, guanti e stivali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Bentiavalicarb-isopropil 1,75%, Mancozeb 70% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Bentiavalicarb-isopropil: ----

Mancozeb: sintomi: cute: dermatiti, sensibilizzazione, occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiche, sensibilizzazione; SNC: atassia, confusione, depressione, iporiflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precondriale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paozzato diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

L'associazione dei due principi attivi contenuti nel prodotto, che separatamente hanno una attività loco sistemica e di contatto, gli conferiscono un'attività preventiva e curativa nei confronti delle peronosspore.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi indicate per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale sulle seguenti colture:

VITE: contro la peronospora (*Plasmopara viticola*) 180-200 g di prodotto distribuendo 1,8-2 Kg/ha di formulato.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi della malattia. Ripetere il trattamento ogni 10-12 gg.

Numero massimo di trattamenti: 6 per ogni anno.

PATATA, contro la peronospora (*Phytophthora infestans*) il prodotto si impiega alla dose di 160 g. di prodotto distribuendo 1,6 Kg/ha di formulato.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi della malattia. Ripetere il trattamento ogni 8-10 gg.

Numero massimo di trattamenti: 6 per ogni anno.

POMODORO contro la peronospora (*Phytophthora infestans*) il prodotto si impiega alla dose di 180-200 g. di prodotto distribuendo 1,8-2 Kg/ha di formulato.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi della malattia. Ripetere il trattamento ogni 8-10 gg.

Numero massimo di trattamenti: 6 per ogni anno.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: stemperare in poca acqua a parte la prestabilita dose di prodotto e versare quindi il tutto nel totale quantitativo di acqua o nelle poltiglie a cui si vuole associare, agitando con cura.

COMPATIBILITÀ: non associare ad oli minerali ed in caso di miscela con concimi fogliari si consiglia di procedere a saggi preliminari.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Nel corso del trattamento tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLA VITE, 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI PATATA E POMODORO IN PIENO CAMPO, 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEL POMODORO IN CULTURA PROTETTA.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento o per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.